

تبرّد

داکتر : فریبا فرحت

تبرد


تعریف : زمانی که انساج
عضویت در اثر تماس و یا
تاثیر دوامدار حرارت پایین
تخریب گردند تبرد گفته
میشود .

عوامل تبرد

- 1 : پایین بودن درجه حرارت ، رطوبت و وزیدن باد .
 - 2: موجودیت تشوشات عمومی و یا موضعی در دوران خون.
 - 3 : لاغری .
 - 4 : انیمی .
 - 5 : موجودیت امراض و عایی
 - 6 : فشار بالای او عیه مصاب ناحیه تبرد
- داکتر فریبا " فرحت "

تصنيف تبرد

تقسيم بندی تبرد



1 : تبرد

درجه اول

2 : تبرد

درجه دوم

3 : تبرد

درجه سوم

4 : تبرد

درجه چهارم

ادامه ...

1: **تبرد درجه اول :** در تبرد درجه اول جلد مصاب تبرد رنگ آبی را اختیار نموده و بعضاً رنگ سرخ ارغوانی می داشته باشد . این تغییرات به خوبی قابل ارجاع بوده و جلد شفایاب می گردد . در بعضی وقایع اپیدرم از درم جدا گردیده و در این صورت زمینه برای درجات مابعد آن آماده میشود .

داکتر فریبا "فرحت"

ادامه ...

2: **تبرد درجه دوم** : در تبرد درجه دوم اپیدرم از درم جدا گردیده در این صورت آبله های خورد و بزرگ در روی جلد از باعث نکروز طبقه سطحی به وجود می آید ، آبله های مذکور حاوی مایع شفاف و بعضاً نرِف بوده ، قوام آبله ها بعضاً سخت و بعضاً نرم می باشد .

داکتر فریبا "فرحت"

ادامه ...

3 : **تبرد درجه سوم** : در تبرد درجه سوم تمام طبقات ، نسج تحت الجلدى و حتى بعضاً عضلات ماووف مى گردد . در اين درجه تبرد التيام بعد از Demarkation و تندب صورت مى گيرد .

4 : **تبرد درجه چهارم** : در تبرد درجه چهارم علاوه از جلد ، نسج تحت الجلدى انسان رخوه و عظام نيز ماووف گرديده ، التيام آن مدت زياد ضرورت دارد .

داکتر فریبا " فرحت "

فریوپتالوژی

در صورت مواجه شدن عضویت به سردی تغییرات اناتوموپتالوژی و فریوپتالوژیک تا اندازه زیاد ارتباط به شدت تبرد ، دوام تبرد ، رطوبت هوا ، مقاومت عضویت مریض و وضع او عیه های ساحه دارد . و نظر به درجات تبرد فرق میکند . علت عمده تغییرات پتالوژیک را ، انجماد و عکس العمل او عیه در مقابل تبرد تشکل می دهد

در ابتدا او عیه ساحه و مجاور آن سپزم میکند ولی این سپزم گذری بوده بعد از یک مدت او عیه مصاب سپزم دوباره توسع می نماید

در بعضی اوقات در صورت دوام تبرد ، امکان دارد توسع دوباره به تقبض تبدیل گردد .

ادامه ...


در افراد پیر ، لاغر و کم خون امکان دارد سپزم و تقبض اولی اوعیه به حالت خود دوام نموده و قطعاً توسع دوباره حاصل نشود . از اینرو تبرد در این اشخاص سیر بسیار وخیم دارد

از همه اولتر سپزم در اوعیه شعریه به وجود می آید بعداً آورده کوچک نیز مصاب آن می گردد که سبب رکودت خون و بطی شدن دوران شده و سبب ترمبوز می گردد علت فوت انساج را در تبرد انجماد انساج تشکیل میدهد .

اعراض سریری

اعراض سریری مربوط به عمق آفات و اختلاطات

آن می باشد . که دو مرحله دارد



1: مرحله قبل از

عکس العمل

2: مرحله

عکس العملی